

이소트레티노인 환자 동의서

의사가 환자에게 임신관련 위험성을 고지하고 이에 대한 인지 여부를
동의 받는 방식과 절차는 자율적으로 진행할 수 있습니다.
환자에게 고지되어야 할 주요 내용의 예시는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 이소트레티노인은 비타민 A의 대사체로 피지 분비를 감소시켜 여드름치료제 사용됩니다.
2. 약 복용 중 임신을 할 경우에는 태아 기형이 유발될 수 있으므로 임신 중이거나 임신할 가능성이 있는 경우 이 약을 복용해서는 안됩니다.
3. 임신 가능성이 있을 경우, 임신 유무를 확인하고 1달 후 재확인하여 임신이 아니면 약을 복용합니다.
4. 약 복용 1개월 전, 복용 중 및 중단 1달까지 효과적인 두가지 피임을 합니다.(콘돔, 피임약 복용 등)
5. 약 복용 중 및 중단 1달 이내 임신을 하거나 임신이 의심되는 경우 처방의사와 상담을 받아야 합니다.
6. 다른 질환이 있거나, 복용약이 있는 경우 진료 시 담당의사에게 반드시 고지해야 합니다.
7. 약 복용 중, 혹은 중단 1달까지 헌혈을 금합니다.
8. 약은 타인에게 양도해서는 안됩니다. 치료종료 후 남은 약은 폐기될 수 있도록 약국에 반납해야 합니다.

본인은 담당의사(처방한 의사 본인이 기재)로부터
본 의약품의 사용 전 위 사항에 대한 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

날짜: 년 월 일
이름: (서명)

알리트레티노인 환자 동의서

의사가 환자에게 임신관련 위험성을 고지하고 이에 대한 인지 여부를
동의 받는 방식과 절차는 자율적으로 진행할 수 있습니다.
환자에게 고지되어야 할 주요 내용의 예시는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 알리트레티노인은 강력한 국소 스테로이드 치료에도 반응하지 않는 성인의 재발성 만성 중증 손습진 치료제입니다.
2. 약 복용 중 임신을 할 경우에는 태아 기형이 유발될 수 있으므로 임신 중이거나 임신할 가능성이 있는 경우 이 약을 복용해서는 안됩니다.
3. 임신 가능성이 있을 경우, 임신 유무를 확인하고 1달 후 재확인하여 임신이 아니면 약을 복용합니다.
4. 약 복용 1개월 전, 복용 중 및 중단 1달까지 효과적인 두가지 피임을 합니다.(콘돔, 피임약 복용 등).
5. 약 복용 중 및 중단 1달 이내 임신을 하거나 임신이 의심되는 경우 처방의사와 상담을 받아야 합니다.
6. 다른 질환이 있거나, 복용약이 있는 경우 진료 시 담당의사에게 반드시 고지해야 합니다.
7. 약 복용 중, 혹은 중단 1달까지 헌혈을 금합니다.
8. 약은 타인에게 양도해서는 안됩니다. 치료종료 후 남은 약은 폐기될 수 있도록 약국에 반납해야 합니다.

본인은 담당의사(처방한 의사 본인이 기재)로부터
본 의약품의 사용 전 위 사항에 대한 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

날짜: 년 월 일
이름: (서명)

아시트레틴 환자 동의서

의사가 환자에게 임신관련 위험성을 고지하고 이에 대한 인지 여부를
동의 받는 방식과 절차는 자율적으로 진행할 수 있습니다.
 환자에게 고지되어야 할 주요 내용의 예시는 다음과 같습니다.

- 다음 -

1. 아시트레틴은 retinoic acid의 합성방향족 동족체로 건선 및 각화질환 치료에 사용됩니다.
2. 약 복용 중 임신을 할 경우에는 태아에 기형유발이 가능하므로 임신 중이거나 임신 할 가능성이 있는 경우 약을 복용해서는 안됩니다.
3. 약 복용 1개월 전, 복용 중, 복용 중단 후 3년까지 효과적인 피임을 해야 합니다.(콘돔/피임약복용 등)
4. 약 복용 중 및 복용 후 2개월 후까지 에탄올을 함유한 술, 음식을 섭취하면 안됩니다.
에탄올이 약의 반감기를 증가시켜 기형 유발기간이 3년보다 길어질 수 있습니다.
5. 신장애 및 간장애 등 다른 질환이 있는 경우 담당의사에게 반드시 고지해야 합니다.
6. 약 복용 중 및 복용 종료 3년 후까지 헌혈해서는 안됩니다.
7. 타인에게 약을 양도하지 마십시오. 치료종료 후 남은 약은 폐기될 수 있도록 약국에 반납해야 합니다.

본인은 담당의사(처방한 의사 본인이 기재)로부터
본 의약품의 사용 전 위 사항에 대한 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

날짜: 년 월 일
이름: (서명)