

임신예방프로그램 레티노이드 계열 약물 체크리스트 (약사용)

레티노이드 계열 제제 조제 시 아래 사항을 확인하여 주십시오.

1	임부·수유부 및 임신을 계획 중인 여성에게는 본 제제를 조제하지 않습니다. 가임 여성 환자가 복용을 원하는 경우, 임신 가능성 여부를 확인하십시오.	
2	환자가 임신 중이거나 임신을 계획 중인 경우 이 약을 복용하지 말아야 한다는 것을 환자가 이해했는지 확인하고 치료 중과 치료 후 1개월까지(아시트레틴 제제의 경우 3년까지) 임신 여부를 확인하도록 합니다. 가임 여성이 본 제제를 복용 중 임신할 경우, 투여 용량과 기간에 상관없이 태아 기형을 유발할 수 있음을 안내하고, 즉시 치료를 중단한 뒤 처방의사에게 상담 받아야 함을 안내합니다.	
3-1	가임 여성 환자의 경우 본 제제 복용 1개월 전, 복용 중 및 복용 종료 1개월 후까지(아시트레틴 제제의 경우 복용 종료 3년 후까지) 반드시 두 가지 이상의 효과적인 피임법을 실시할 것을 안내하며, 추후에 임신의 위험이 있을 경우 처방 의사에게 상담 받아야 함을 안내합니다.	
3-2	비가임 여성 환자(자궁적출의 경우는 제외)라도 효과적인 피임법을 실시하도록 권장하며, 남성 환자의 경우(이소트레티노인 및 알리트레티노인에 한함) 과량투여시에는 정액에서의 약물농도가 정상치보다 높을 것으로 예상되므로 30일간 콘돔을 사용하거나 임신 중 또는 임신 가능성이 있는 여성과의 성생활을 피해야 함을 안내합니다.	
4	환자가 타인에게 약을 양도해서는 안되며, 치료 종료 후 남은 약은 폐기될 수 있도록 약국에 반납해야 함을 안내합니다.	
5	환자가 본 제제 복용 중 그리고 복용 종료 후 1개월 후까지(아시트레틴 제제의 경우 복용 종료 후 3년 후까지) 헌혈하지 않도록 안내합니다. 환자 또한 본 제제를 복용하는 환자로부터 수혈 받지 않도록 안내합니다.	
6	(아시트레틴 제제 처방 환자만 해당) 에탄올이 아시트레틴의 반감기를 증가시켜 기형유발 기간이 3년보다 길어질 수 있으므로 아시트레틴 제제 복용 중 및 복용 종료 후 2개월 후까지 에탄올을 함유한 술, 음식을 섭취하지 않도록 안내합니다	
7	환자용 안내서를 제공하거나 전자문서로 열람(다운로드) 할 수 있음을 안내합니다.	
8	조제일자가 처방전 발행일로부터 7일 이내인지 확인 후 조제합니다.	

※ 본 안내자료는 임신예방프로그램 안내 홈페이지(www.retichack.com)에 게시되어 있으며, 다운로드 받으실 수 있습니다.