

레티노이드계열 약물 처방 체크리스트 [의사용]



임신예방프로그램 의사 체크리스트		
처방		
환자의 중증 여드름 치료를 위하여 isotretinoin을 처방함을 확인합니다.	예	아니오
최기형성 안내		
이 약물은 태아 기형을 유발할 수 있는 약물이며, 가임기의 여성이 이 약물을 복용 중 임신할 경우, 투여 용량과 기간에 관계없이 태아 기형을 유발할 수 있음을 안내하였습니다.	예	아니오
이 약물을 복용 중 임신할 경우, 자연 유산의 위험이 증가함을 안내하였습니다.	예	아니오
임산부는 이 약물을 사용할 수 없음을 안내하였습니다.	예	아니오
임신가능성 및 피임		
이 약물을 복용 1개월 전, 복용 중, 복용 중단 후 1개월 간 2가지 이상의 효과적인 피임법을 지속적으로 사용해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
환자의 상황에 맞는 효과적인 피임법을 상담 및 안내하였습니다.	예	아니오
비가임(자궁적출의 경우는 제외)의 여성이라도 효과적인 피임법을 실시하도록 권장하며, 남성환자의 경우에도 과량투여시에는 정액에서의 약물농도가 정상치보다 높을 것으로 예상되어 30일간 콘돔을 사용하거나 가임기의 여성과의 성생활을 피해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
임신 검사 안내		
약물 처방 전, 환자의 임신여부 확인을 위해 의학적 감독 아래 임신검사를 진행함을 안내하였습니다.	예	아니오
이 약물의 처방은 후속 임신여부 확인 및 환자 상태 모니터링을 위해 최대 30일로 제한됨을 안내하였습니다.	예	아니오
이 약물이 최기형성이 있으므로, 복용 중, 복용 후 1개월 내 임신검사를 한번 실시해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
약물 복용 중 임신을 하였거나, 임신이 의심된다면 처방의에게 즉시 연락해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
약물 복용 중 임신을 하였거나, 임신이 의심된다면 즉시 약 복용을 중단해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
기타 안내		
이 약물을 환자 외 타인에게 양도하여서는 안되며, 치료 중단 또는 종료 후 남은 약은 폐기될 수 있도록 약국에 반납해야 함을 안내하였습니다.	예	아니오
이 약물을 복용 중, 복용 후 1개월 간, 헌혈을 하거나 본 제제를 복용하는 환자로부터 수혈을 받으면 안됨을 안내하였습니다.	예	아니오
지금까지의 모든 사항을 안내 후, '충분한 설명을 안내 받았다'는 환자 동의서를 받았음을 확인합니다.	예	아니오

처방의 성명:

처방의 서명:

날짜: 20

. . .

